

ЕТИКЕТ НА ПРОДУКТ: ДИФОРА СЛ (DIFORA SL)

1. ТЕХНИЧЕСКА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- **Търговско наименование:** ДИФОРА 720 СЛ / DIFORA 720 SL
- **Активно вещество:** 2,4-Д Диметиламинна сол - 720 г/л (изразено като 2,4-Д киселина)
- **Група:** Селективен системен хербицид от групата на фенокси-карбоксилните киселини (HRAC група 4).
- **Препаративна форма:** Воден разтвор (SL).

2. КЛАСИФИКАЦИЯ И СИМВОЛИ (СЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ)

Въз основа на Раздел 2 от МСДС, трябва да включиш точно тези три пиктограми:

- **Сигнална дума:** ОПАСНО / DANGER
- **Пиктограми:** (GHS05 , GHS08 , GHS09  .
- **Предупреждения за опасност (H-фрази):**
 - **H302:** Вреден при поглъщане.
 - **H318:** Предизвиква сериозно увреждане на очите.
 - **H372:** Причинява увреждане на органите (черен дроб, бъбреци) при продължителна или многократна експозиция.
 - **H411:** Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
- **Препоръки за безопасност (P-фрази):**
 - **P102:** Да се съхранява извън обсега на деца.
 - **P260:** Не вдишвайте мъглата/парите/спрея.

- **P280:** Използвайте предпазни ръкавици, защитно облекло и предпазни очила/ маска за лице.
- **P305+P351+P338:** ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължете с изплакването.
- **EUN401:** За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

4. ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ (Обновена съгласно МСДС)

Култура	Плевели	Доза	Момент на приложение	Карантинен срок
Есенна и пролетна пшеница, ечемик	Широколистни плевели (полски синап, дива ряпа, лобода, овчарска торбичка, паламида, щир, повитица и др.)	70 – 100 мл/дка	Прилага се във фаза братене до начало на вретенене на културата.	30 дни
Царевица	Широколистни плевели (полски синап, дива ряпа, лобода, овчарска торбичка, паламида, щир, повитица и др.)	70 – 100 мл/дка	Прилага се във фаза 3-5 лист на културата (при височина на растенията 20-30 см).	Не се изисква

Експортиране в Таблици

4. ПЪРВА ПОМОЩ

- **Специфичен антидот:** Не е известен. Лечението е симптоматично.
- **При поглъщане:** Промийте устата с вода. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не е указано от медицинско лице.
- **При контакт с кожата:** Свалете замърсеното облекло и измийте обилно със сапун и вода.

5. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (ЛПС) ПРИ АПЛИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА:

- **Защита на ръцете:** Използвайте химически устойчиви ръкавици (нитрилни или неопренови).

- 




 Използвайте респиратор с комбиниран филтър за защита срещу аерозоли.
- Пиктограми за защитните предпазни средства:**
-

6. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА (ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ)

- Механизъм на действие:** Селективен, системен хербицид. Абсорбира се основно от листата и се придвижва към точките на растеж на плевелите, като нарушава техния метаболизъм.
- Оптимални условия:** Най-добър ефект се постига, когато плевелите са в активен растеж (фаза 2-4 лист) и температурата е между 12°C и 25°C. Да не се пръска при очакван валеж до 4-6 часа след третирането.
- Разход на работен разтвор:** 20–40 литра вода на декар (200-400 л/ха).

7. ПОДГОТОВКА НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

- Процес:** Напълнете резервоара на пръскачката до 1/4 - 1/2 от обема му с чиста вода. Стартирайте бъркалката. Изчислете и добавете необходимото количество **ДИФОРА 720 СЛ** директно в резервоара. Допълнете с останалата вода, докато бъркалката продължава да работи.
- Важно:** Използвайте разтвора веднага след приготвяне. Не го оставяйте да престоява в пръскачката за следващия ден.
- Почистване на пръскачката:** След употреба пръскачката трябва да се измие изключително старателно с вода и почистващ агент, тъй като остатъци от 2,4-D могат да увредят следващата култура.

8. СЪВМЕСТИМОСТ (СМЕСВАНЕ С ДРУГИ ПРОДУКТИ)



AGRICO GROUP LTD, SOFIA, BULGARIA

- **Общи правила:** ДИВОНА А4020 Българска, бул. Джеймс Баучер № 77, София 1407, България, т.ф. (+3592) 9624074; факс (+3592) 9625163; Email address: agrico.group@gmail.com

AGRICO GROUP
Innovation in Agriculture

- **Смесване с торове:** Може да се смесва с листни торове и течен азот (UAN), но трябва първо да се разтвори хербицидът и после да се добави торът.
- **ВНИМАНИЕ:** Преди всяко ново смесване винаги правете предварителен тест в малък съд за физическа съвместимост (пресичане/утаяване).
- **Специфично за Грузия:** Не се препоръчва смесване със силно алкални продукти.

9. ФИТОТОКСИЧНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- **Чувствителни култури:** Изключително опасен за широколистни култури като памук, домати, овощни дървета, лозя и слънчоглед. Избягвайте "дрейф" (отнасяне на капчиците) към съседни ниви.

10. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. **Цветна лента:** За този продукт се изисква жълта сигнална лента една хоризонтална лента в долната част на етикета - **ЖЪЛТА** (II клас),
2. **Производител и дистрибутор:** Agrico Group Ltd, бул. Джеймс Баучер № 77, София 1407, България, т.ф.: +35929625680; мейл: agrico.group@gmail.com