

ЭТИКЕТКА ПРЕПАРАТА: ДИФОРА 720 СЛ (DIFORA 720 SL)

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- **Торговое наименование:** ДИФОРА 720 СЛ / DIFORA 720 SL
- **Действующее вещество:** 2,4-Д диметиламинная соль, 720 г/л (в кислотном эквиваленте)
- **Группа:** Селективный системный гербицид группы феноксикарбоновых кислот (HRAC группа 4).
- **Препаративная форма:** Водный раствор (BP / SL).

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И СИМВОЛЫ (СЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ)

- **Сигнальное слово:** ОПАСНО / DANGER
- **Пиктограммы:** GHS05  , GHS08  , GHS09  .
GHS09

Краткая характеристика опасности (H-фразы):

- **H302:** Вредно при проглатывании.
- **H318:** Вызывает серьезные повреждения глаз.
- **H372:** Наносит вред органам (печень, почки) в результате длительного или многократного воздействия.
- **H411:** Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Меры предосторожности (P-фразы):

- **P102:** Хранить в недоступном для детей месте.
- **P260:** Не вдыхать туман/пары/спрей.
- **P280:** Использовать защитные перчатки, защитную одежду и средства защиты глаз/лица.
- **P305+P351+P338:** ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

- **EUN401:** Чтобы избежать рисков для здоровья человека и окружающей среды, соблюдайте инструкцию по применению.

3. ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ

Культура	Сорные растения	Дозировка	Время применения	Срок ожидания
Озимая и яровая пшеница, ячмень	Широколистные сорняки (горчица полевая, дикая редька, марь белая, пастушья сумка, бодяк полевой, щирица, вьюнок полевой и др.)	0,7 – 1 л/га	Применять в фазе кущения до начала выхода в трубку культуры.	30 дней
Кукуруза	Широколистные сорняки (горчица полевая, дикая редька, марь белая, пастушья сумка, бодяк полевой, щирица, вьюнок полевой и др.)	0,7 – 1 л/га	Применять в фазе 3-5 листьев культуры (при высоте растений 20-30 см).	Не регламентируется

Експортиране в Таблицы

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- **Специфический антидот:** Неизвестен. Лечение симптоматическое.
- **При проглатывании:** Прополоскать рот водой. Не вызывать рвоту без указания медицинского работника.
- **При попадании на кожу:** Снять загрязненную одежду и обильно промыть кожу водой с мылом.

5. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ):

Защита рук: Использовать химически стойкие перчатки (нитриловые или неопреновые).

Защита глаз: Плотно прилегающие защитные очки или защитная маска для лица (обязательно согласно H318).

Защита кожи и тела: Использовать специальную защитную одежду (комбинезон) и прорезиненную обувь.

Защита органов дыхания: При проведении опрыскивания использовать респиратор с фильтром для защиты от паров и аэрозолей. (точен превод на бг)

Пиктограммы защитных предпазных средств:



6. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

- **Механизм действия:** Селективный системный гербицид. Поглощается в основном листьями и перемещается к точкам роста сорняков, нарушая их метаболизм и вызывая гибель.
- **Оптимальные условия:** Наилучший эффект достигается, когда сорняки находятся в фазе активного роста (2-4 листа), а температура воздуха составляет от 12°C до 25°C. Не проводить обработку, если в ближайшие 4-6 часов ожидаются осадки (дождь).
- **Расход рабочего раствора:** 200–400 литров воды на гектар (20–40 л/дка).

7. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

- **Процесс:** Наполните бак опрыскивателя на 1/4 – 1/2 объема чистой водой. Включите мешалку. Рассчитайте и добавьте необходимое количество **ДИФОРА 720 СЛ** непосредственно в бак. Долейте оставшуюся воду при работающей мешалке.
- **Важно:** Используйте рабочий раствор сразу после приготовления. Не оставляйте его в опрыскивателе на следующий день.
- **Очистка опрыскивателя:** После использования опрыскиватель необходимо тщательно промыть водой с добавлением чистящего средства, так как остатки 2,4-Д могут повредить последующие чувствительные культуры.

8. СОВМЕСТИМОСТЬ (СМЕШИВАНИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ)

Общие правила: ДИФОРА 720 СЛ совместим с большинством гербицидов, инсектицидов и фунгицидов, применяемых на зерновых культурах и кукурузе.

Смешивание с удобрениями: Можно смешивать с листовыми удобрениями и КАС (UAN), но сначала необходимо растворить гербицид, а затем добавить удобрение.

ВНИМАНИЕ: Перед каждым новым смешиванием всегда проводите предварительный тест на физическую совместимость в небольшой емкости.

Специфично для Грузии: Не рекомендуется смешивать с сильно щелочными продуктами.

9. ФИТОТОКСИЧНОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Чувствительные культуры: Чрезвычайно опасен для широколистных культур, таких как хлопок, томаты, плодовые деревья, виноградники и подсолнечник. Избегайте сноса препарата на соседние участки.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Цветная полоса:** Для данного продукта требуется желтая сигнальная полоса — одна горизонтальная полоса в нижней части этикетки — **ЖЕЛТАЯ (II класс опасности)**.
- **Производитель и дистрибьютор:** Agrico Group Ltd, бул. Джеймс Баучер № 77, София 1407, Болгария, тел.: +35929625680; e-mail: agrico.group@gmail.com