

ЕТИКЕТ НА ПРОДУКТ: ГЛИФОЗАН СЛ (GLYPHOSAN SL)

1. ТЕХНИЧЕСКА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- **Търговско наименование:** ГЛИФОЗАН / GLYPHOSAN
- **Активно вещество:** Глифозат 360 г/л (под формата на изопропиламинава сол)
- **Група:** Тотален системен хербицид.
- **Препаративна форма:** Разтворим концентрат (PK / SL).

2. КЛАСИФИКАЦИЯ И СИМВОЛИ (СЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТ)

- **Сигнална дума:** ВНИМАНИЕ / WARNING
- **Пиктограми:** GHS09  GHS09 
GHS09
- **Предупреждения за опасност (H-фрази):**
 - **H319:** Предизвиква сериозно дразнене на очите.
 - **H351:** Предполага се, че причинява рак (при експозиция на големи количества или продължителен контакт).
 - **H373:** Може да причини увреждане на органите при продължителна или многократна експозиция.
 - **H411:** Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
- **Препоръки за безопасност (P-фрази):**
 - **P102:** Да се съхранява извън обсега на деца.
 - **P201:** Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
 - **P202:** Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки.
 - **P260:** Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

- **P280:** Използвайте задължително предпазни ръкавици, защитно облекло и предпазни очила.
- **P308+P313:** ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/помощ.
- **P501:** Съдържанието/контейнерът да се изхвърли съгласно местните регламенти.
- **EUN401:** За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

3. ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ

Култура / Обект	Вредител (Плевели)	Момент на приложение	Доза	Карантинен срок
Овощни градини и Лозя	Едногодишни житни и широколистни	Във фаза активен растеж на плевелите.	200 – 400 мл/дка	30 дни
Овощни градини и Лозя	Многогодишни (балур, трескот, поветица)	При височина на плевелите 15-20 см или по време на цъфтеж.	400 – 800 мл/дка	30 дни
Свободни площи, Стърнища	Общо унищожаване на вегетацията	След прибиране на реколтата или при свободни площи.	400 – 1000 мл/дка	-
Преди сеитба (Царевица, Житни)	Поникнали едногодишни и многогодишни	Преди сеитба или преди поникване на културата.	300 – 500 мл/дка	-

Експортиране в Таблици

4. ПЪРВА ПОМОЩ

- **Специфичен антидот:** Не е известен. Лечението е симптоматично.
- **При поглъщане:** Изплакнете устата. Не предизвиквайте повръщане. Потърсете лекар.
- **При контакт с кожата:** Свалете замърсеното облекло. Измийте обилно с вода и сапун.
- **При контакт с очите:** Изплакнете обилно с вода за поне 15 минути.
- **При вдишване:** Изведете пострадалия на чист въздух.

5. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (ЛПС)

- **Защита на ръцете:** Химически устойчиви ръкавици.
- **Защита на очите:** Защитни очила.
- **Защита на тялото:** Защитно работно облекло и гумени ботуши.
- **Дихателна защита:** Обикновена маска при риск от разсейване на разтвора.

Pictogrami:



6. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ

- **Механизъм на действие:** Системен хербицид, който се абсорбира от листата и се трансплацира до корените и коренищата. Инхибира синтеза на аминокиселини.
- **Оптимални условия:** Температура 10°C - 25°C. Да не се пръска при вятър (риск от отнасяне върху съседни култури).
- **Устойчивост на отмиване:** Необходими са поне 6 часа без валежи след пръскане.
- **Разход на работен разтвор:** 15-30 литра вода на декар.

7. ПОДГОТОВКА НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

- **Смесване:** Напълнете 1/2 от резервоара, добавете **ГЛИФОЗАН**, включете бъркалката и допълнете.
- **Почистване:** Измийте пръскачката обилно с вода веднага след употреба

8. СЪВМЕСТИМОСТ

- Продуктът може да се смесва с определени почвени хербициди, но винаги правете тест. Да не се смесва с продукти, съдържащи сяра или силно алкални разтвори.

9. ФИТОТОКСИЧНОСТ

- Продуктът е тотален хербицид и унищожава всяка зелена растителност, до която се докосне. Да се прилага само върху целевите плевели.

10. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

- **Цветна лента: ЖЪЛТА СИГНАЛНА ЛЕНТА (II клас).**
- **Производител и дистрибутор:** Agrico Group Ltd, бул. Джеймс Баучер № 77, София 1407, България; Tel: +35929625680; Email: agrico.group@gmail.com