

ЭТИКЕТКА ПРЕПАРАТА: КУНГ-ФУ КЭ (KUNG-FU EC)

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

- **Торговое наименование:** КУНГ-ФУ КЭ / KUNG-FU EC
- **Действующее вещество:** Лямбда-цигалотрин 50 г/л
- **Группа:** Несистемный инсектицид контактно-кишечного действия из группы синтетических пиретроидов.
- **Препаративная форма:** Концентрат эмульсии (КЭ / EC).

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И СИМВОЛЫ (РАЗДЕЛ БЕЗОПАСНОСТИ)

- **Сигнальное слово:** ВНИМАНИЕ / WARNING

- **Пиктограммы:** GHS07  , GHS08  , GHS09 
GHS07 GHS08 GHS09

- **Предупреждения об опасности (H-фразы):**
 - **H302:** Вредно при проглатывании.
 - **H304:** Может быть смертельно при проглатывании и попадании в дыхательные пути.
 - **H317:** Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
 - **H332:** Вредно при вдыхании.
 - **H410:** Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.



AGRICO GROUP
Innovation in Agriculture

AGRICO GROUP LTD, SOFIA, BULGARIA

Sofia - 1407, Bulgaria, boul. James Baucher 77

tlf: (3592)9624074

fax: (3592) 9625163;

Email address: agrico.group@gmail.com

- **Меры предосторожности (P-фразы):**

- **P102:** Хранить в недоступном для детей месте.
- **P261:** Избегать вдыхания паров/распылителей.
- **P280:** Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз.
- **P301+P310:** ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу.
- **P331:** НЕ вызывать рвоту.
- **P391:** Собрать пролившийся препарат.
- **P501:** Утилизировать содержимое/контейнер в соответствии с местными правилами.
- **EUN401:** Во избежание рисков для здоровья человека и окружающей среды соблюдайте инструкцию по применению.

3. ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЗИРОВКИ

Культура	Вредители	Момент обработки	Дозировка	Срок ожидания
Яблоня, персик, груша, слива	Плодожорки, долгоносики, клещи, щитовки, моли	В период вегетации	0.4 – 0.8 л/га	14 дней
Томаты, капуста	Капустная совка, капустная моль, белокрылки	В период вегетации	0.1 л/га	7 дней
Картофель	Колорадский жук и др. вредители	В период вегетации	0.1 – 0.2 л/га	14 дней
Виноградники	Клещи, гроздевая листовертка	В период вегетации	0.3 – 0.4 л/га	14 дней
Пшеница, ячмень	Хлебные клопы, трипсы, вредная черепашка	В период вегетации	0.3 – 0.4 л/га	28 дней
Сахарная свекла	Блошки	В период вегетации	0.1 л/га	-

Экспортиране в Таблицы

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- **При проглатывании:** НЕ вызывать рвоту из-за риска аспирации в легкие. Немедленно обратиться к врачу и предъявить этикетку или MSDS.

- **При контакте с кожей:** Снять загрязненную одежду. Тщательно промыть кожу водой с мылом.
- **При контакте с глазами:** Осторожно промывать водой в течение не менее 15 минут.
- **При вдыхании:** Вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить покой для дыхания.

5. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

- **Защита рук:** Нитриловые перчатки.
- **Защита глаз:** Защитные очки или защитный экран.
- **Защита тела:** Защитный комбинезон и резиновые сапоги.
- **Защита дыхания:** Обязательное использование респиратора во время опрыскивания.

Пиктограммы:



6. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- **Механизм действия:** Мощный инсектицид с быстрым «нокдаун-эффектом». Действует контактно и при попадании внутрь, поражая нервную систему насекомых.
- **Оптимальные условия:** Не применять при температуре выше 25°C. Наилучшие результаты достигаются при опрыскивании рано утром или вечером.
- **Устойчивость к смыванию:** Препарат устойчив к дождю через 1-2 часа после высыхания.
- **Расход рабочего раствора:** 200–1000 литров воды на гектар в зависимости от культуры.

7. ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО РАСТВОРА

- Наполнить бак опрыскивателя водой наполовину. Добавить дозу **КУНГ-ФУ КЭ**, включить мешалку и долить воду. Использовать раствор немедленно.

8. СОВМЕСТИМОСТЬ

- Совместим с большинством фунгицидов и гербицидов, но всегда проводить тест на совместимость. Не смешивать с сильнощелочными растворами (например, бордоская жидкость).

9. ФИТОТОКСИЧНОСТЬ

- При соблюдении рекомендаций препарат не проявляет фитотоксичности для зарегистрированных культур.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- **Цветная полоса: СИНЯЯ СИГНАЛЬНАЯ ПОЛОСА (III класс).**
- **Производитель и дистрибьютор:** Agrico Group Ltd, бул. Джеймса Баучера № 77, София 1407, Болгария; Tel: +35929625680; Email: agrico.group@gmail.com